

แบบบันทึกสำหรับเกษตรกร

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช กระเจียวเขียว



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สิงหาคม 2550

แบบบันทึก
ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระจี๊บบเจี้ยว
สำหรับเกษตรกร



จัดพิมพ์โดย
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สิงหาคม 2550

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว^๗

สารบัญ

เกษตรกร

ลำดับที่	หน้า
1. เกษตรกร-ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร-ข้อมูลประจำฟาร์ม	3
2. เกษตรกร-แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้	7
3. เกษตรกร-แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต	8
4. เกษตรกร-การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช	10
5. เกษตรกร-การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในฟาร์ม	22

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบบันทึก ข้อมูลประจำฟาร์ม	หมายเลขเอกสาร 03-01 -.....-..... เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 1/2 วันที่ประกาศใช้...../...../.....
--	--

ข้อมูลประจำปี.....

เจ้าของฟาร์มชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....

หมายเลขประจำฟาร์ม □□□ - □□□ - □□□□□□

พืช.....จำนวน.....ไร่ แยกเป็น.....แปลง

ชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน

(นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

เลขที่หมู่ที่.....บ้าน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....e-mail.....

ลงชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน.....
(.....)

ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่หมู่ที่.....บ้าน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

แผนผังที่ตั้งฟาร์ม แสดงเส้นทางคมนาคม และสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังฟาร์ม

ทิศเหนือ


1.1 พันธุ์ที่ปลูก

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

1.2 ระบบน้ำที่ใช้.....อัตราการจ่ายน้ำ.....ลิตร/ชั่วโมง

1.3 ประเภทดิน.....

1.4 ประวัติการใช้พื้นที่การผลิต ก่อนปลูกพืชปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี

☐ พื้นที่ไม่เคยใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

☐ พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ชนิดของพืชที่เคยปลูกมาก่อน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

1.5 ประวัติการแพร่ระบาดของศัตรูพืช และการจัดการ

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ร้อยละ.....การกำจัด.....

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ร้อยละ.....การกำจัด.....

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ร้อยละ.....การกำจัด.....

1.6 ชนิดของพืชที่ปลูกข้างเคียง ☐ ไม่มี ☐ มี.....

1.7 ข้อมูลอื่น ๆ.....

แผนที่ภายในฟาร์ม (ระบุ แหล่งน้ำ อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ปรากฏในฟาร์ม)

ทิศเหนือ



แบบบันทึกของเกษตรกร

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว^๓

แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้สำหรับบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อผลิตกระเจี๊ยบเขียวตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว ประกอบด้วยแบบบันทึกต่าง ๆ ตามพัฒนาการของกระเจี๊ยบเขียว และตามระบบการจัดการคุณภาพ รวมทั้งสิ้น 3 แบบ ได้แก่

1. แบบบันทึก แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต
2. แบบบันทึก การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูกระเจี๊ยบเขียว
3. แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวกระเจี๊ยบเขียวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในฟาร์ม
 - เกษตรกรจะต้องกรอกแบบบันทึกให้ครบถ้วนทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
 - ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ เพื่อระบุชนิดของศัตรูพืชที่เกิดการระบาด
 - ต้องระบุอัตราของสารเคมีที่ใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร และปริมาตรรวมของสารเคมีที่ใช้พ่นทั้งฟาร์มในแต่ละครั้งที่ปฏิบัติ
 - แบบบันทึกสามารถนำไปถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้ ถ้ามีจำนวนไม่พอ
 - ต้องลงชื่อ พร้อมชื่อเต็มของเจ้าของฟาร์ม และวัน-เดือน-ปี ที่บันทึก ในแบบบันทึกทุกแผ่นจึงจะถือว่าเป็นแบบบันทึกที่ถูกต้องสมบูรณ์

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

บัญชีแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารควบคุมการเจริญเติบโต อาหารเสริม
สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดแมลงและไร สารป้องกันกำจัดวัชพืช และอื่นๆ

[illegible]

หมายเหตุ ^{1/} ระบุประเภทปุ๋ย (เคมี หรืออินทรีย์) ชนิด (ทางดิน ทางใบ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก) และเกรดปุ๋ย หรือ ระบุชื่อสามัญ และชื่อการค้าของสารเคมี

^{2/} ระบุชื่อหน่วยงาน บริษัท หรือห้างร้าน ที่ซื้อหรือได้ปัจจัยการผลิตมา

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

บัญชีแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารควบคุมการเจริญเติบโต อาหารเสริม
สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดแมลงและไร สารป้องกันกำจัดวัชพืช และอื่นๆ

[illegible]

หมายเหตุ ^{1/} ระบุประเภทปฏึก (เคมี หรืออินทรีย์) ชนิด (ทางดิน ทางใบ ปฏึกพืชสด ปฏึกดอก ปฏึกหมัก) และเกรดปฏึก หรือ ระบุชื่อสามัญ และชื่อการค้าของสารเคมี

^{2/} ระบุชื่อหน่วยงาน บริษัท หรือห้างร้าน ที่ซื้อหรือได้ปัจจัยการผลิตมา

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูกระเจียบเขียว และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระเจียบเขียว ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อหน้า 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	หนอนกระทู้หอม	☐ พบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ มากกว่า 1 ตัวหรือกลุ่มต่อต้น ☐ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเอนซิส (60 กรัม) ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครซิส (30 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	หนอนเจาะสมอฝ้าย	☐ พบตัวหนอนมากกว่า 1 ตัวต่อ 2 ต้น หรือ ไข่มากกว่า 1 ฟองต่อต้น ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครซิส (30 มล.) ☐ คลอร์ฟลูอาซารอน 5 % อีซี (20มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	หนอนกระทู้ผัก	☐ พบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่มากกว่า 1 ตัวหรือกลุ่มต่อ 2 ต้น ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครซิส (30 มล.) ☐ คลอร์ฟลูอาซารอน 5% อีซี (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	เพลี้ยไฟ	☐ พบเพลี้ยไฟมากกว่า 1 ตัวต่อใบ/ฝัก ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	เพลี้ยจักจั่นฝ้าย	☐ พบเพลี้ยจักจั่นที่ใบมากกว่า 1 ตัวต่อใบ ☐ เฟนโทรพาทริน 10% อีซี (20 มล.) ☐ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี (50 มล.). ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.). ☐ สารสกัดสะเดา (ตามคำแนะนำบนฉลาก) ☐ อื่นๆ ^{2/}		

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระจับปี่เขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบบันทึก การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูกระจับปี่เขียว	หมายเลขเอกสาร 03-03 -.....-..... เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 2/2 วันที่ประกาศใช้...../...../.....
---	--

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูกระจับปี่เขียว และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระจับปี่เขียว ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อหน้า 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ไร่/ไร่ปลูก)	
	แมลงหวี่ขาว	☐ พบแมลงหวี่ขาว ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคสแคป	☐ พบอาการโรค ☐ สารแมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคใบจุด	☐ พบอาการโรค ☐ แอนทราโคล 70% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ แมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคราแป้ง	☐ พบอาการโรค ☐ กำมะถันผงละลายน้ำ 50 ดับบลิวพี (30 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรค/แมลงอื่น ๆ	☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้)..... ☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้)..... ☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้).....		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ
 2. อื่นๆ ให้ ระบุชื่อสารที่ใช้ และอัตราการใช้

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระจับปี่เขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบบันทึก การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูกระจับปี่เขียว	หมายเลขเอกสาร 03-03-.....-..... เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 1/2 วันที่ประกาศใช้...../...../.....
---	---

หมายเลขประจำฟาร์ม

 -

 -

 เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูกระจับปี่เขียว และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระจับปี่เขียว ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อไร่ 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	หนอนกระทู้หอม	☐ พบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ มากกว่า 1 ตัวหรือกลุ่มต่อต้น ☐ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเอนซิส (60 กรัม) ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครซิส (30 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	หนอนเจาะสมอฝ้าย	☐ พบตัวหนอนมากกว่า 1 ตัวต่อ 2 ต้น หรือ ไข่มากกว่า 1 ฟองต่อต้น ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครซิส (30 มล.) ☐ คลอร์ฟลูอาซารอน 5 % อีซี (20มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	หนอนกระทู้ผัก	☐ พบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่มากกว่า 1 ตัวหรือกลุ่มต่อ 2 ต้น ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครซิส (30 มล.) ☐ คลอร์ฟลูอาซารอน 5% อีซี (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	เพลี้ยไฟ	☐ พบเพลี้ยไฟมากกว่า 1 ตัวต่อใบ/ฝัก ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	เพลี้ยจักจั่นฝ้าย	☐ พบเพลี้ยจักจั่นที่ใบมากกว่า 1 ตัวต่อใบ ☐ เฟนโทรพาทรีน 10% อีซี (20 มล.) ☐ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี (50 มล.) ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ สารสกัดสะเดา (ตามคำแนะนำบนฉลาก) ☐ อื่นๆ ^{2/}		

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระจับปี่เขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบบันทึก การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูกระจับปี่เขียว	หมายเลขเอกสาร 03-03 -.....-..... เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 2/2 วันที่ประกาศใช้...../...../.....
---	--

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูกระจับปี่เขียว และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระจับปี่เขียว ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อหน้า 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ไร่/ไร่ปลูก)	
	แมลงหวี่ขาว	☐ พบแมลงหวี่ขาว ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคสแคป	☐ พบอาการโรค ☐ สารแมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคใบจุด	☐ พบอาการโรค ☐ แอนทราโคล 70% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ แมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคราแป้ง	☐ พบอาการโรค ☐ กำมะถันผงละลายน้ำ 50 ดับบลิวพี (30 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรค/แมลงอื่น ๆ	☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้)..... ☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้)..... ☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้).....		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ
 2. อื่นๆ ให้ ระบุชื่อสารที่ใช้ และอัตราการใช้

หมายเลขประจำฟาร์ม --

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูกระจับปี่เขียว และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระจับปี่เขียว ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อไร่ 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	หนอนกระทู้หอม	☐ พบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ มากกว่า 1 ตัวหรือกลุ่มต่อต้น ☐ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (60 กรัม) ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครชีส (30 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	หนอนเจาะสมอฝ้าย	☐ พบตัวหนอนมากกว่า 1 ตัวต่อ 2 ต้น หรือ ไข่มากกว่า 1 ฟองต่อต้น ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครชีส (30 มล.) ☐ คลอร์ฟลูอาซารอน 5 % อีซี (20มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	หนอนกระทู้ผัก	☐ พบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่มากกว่า 1 ตัวหรือกลุ่มต่อ 2 ต้น ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครชีส (30 มล.) ☐ คลอร์ฟลูอาซารอน 5% อีซี (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	เพลี้ยไฟ	☐ พบเพลี้ยไฟมากกว่า 1 ตัวต่อใบ/ฝัก ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	เพลี้ยจักจั่นฝ้าย	☐ พบเพลี้ยจักจั่นที่ใบมากกว่า 1 ตัวต่อใบ ☐ เฟนโทรฟาทรีน 10% อีซี (20 มล.) ☐ อีโทเฟนพโรคซ์ 10% อีซี (50 มล.) ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ สารสกัดสะเดา (ตามคำแนะนำบนฉลาก) ☐ อื่นๆ ^{2/}		

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูกระจับปี่เขียว และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระจับปี่เขียว ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อหน้า 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	แมลงหวี่ขาว	☐ พบแมลงหวี่ขาว ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคสแคป	☐ พบอาการโรค ☐ สารแมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคใบจุด	☐ พบอาการโรค ☐ แอนทราโคล 70% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ แมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคราแป้ง	☐ พบอาการโรค ☐ กำมะถันผงละลายน้ำ 50 ดับบลิวพี (30 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรค/แมลงอื่น ๆ	☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้)..... ☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้)..... ☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้).....		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ
 2. อื่นๆ ให้ ระบุชื่อสารที่ใช้ และอัตราการใช้

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูกระเจี๊ยบเขียว และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระเจี๊ยบเขียว ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อไร่ 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	หนอนกระทู้หอม	☐ พบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ มากกว่า 1 ตัวหรือกลุ่มต่อต้น ☐ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเอนซิส (60 กรัม) ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครซิส (30 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	หนอนเจาะสมอฝ้าย	☐ พบตัวหนอนมากกว่า 1 ตัวต่อ 2 ต้น หรือ ไข่มากกว่า 1 ฟองต่อต้น ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครซิส (30 มล.) ☐ คลอร์ฟลูอาซารอน 5 % อีซี (20มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	หนอนกระทู้ผัก	☐ พบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่มากกว่า 1 ตัวหรือกลุ่มต่อ 2 ต้น ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครซิส (30 มล.) ☐ คลอร์ฟลูอาซารอน 5% อีซี (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	เพลี้ยไฟ	☐ พบเพลี้ยไฟมากกว่า 1 ตัวต่อใบ/ฝัก ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	เพลี้ยจักจั่นฝ้าย	☐ พบเพลี้ยจักจั่นที่ใบมากกว่า 1 ตัวต่อใบ ☐ เฟนโทรพาทริน 10% อีซี (20 มล.) ☐ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี (50 มล.). ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.). ☐ สารสกัดสะเดา (ตามคำแนะนำบนฉลาก) ☐ อื่นๆ ^{2/}		

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูกระจับปี่เขียว และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระจับปี่เขียว ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อหน้า 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	แมลงหีวขาว	☐ พบแมลงหีวขาว ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคสแคป	☐ พบอาการโรค ☐ สารแมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคใบจุด	☐ พบอาการโรค ☐ แอนทราโคล 70% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ แมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคราแป้ง	☐ พบอาการโรค ☐ กำมะถันผงละลายน้ำ 50 ดับบลิวพี (30 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรค/แมลงอื่น ๆ	☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้)..... ☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้)..... ☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้).....		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ
 2. อื่นๆ ให้ ระบุชื่อสารที่ใช้ และอัตราการใช้

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูกระจับปี่เขียว และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระจับปี่เขียว ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อน้ำ 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	หนอนกระทู้หอม	☐ พบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ มากกว่า 1 ตัวหรือกลุ่มต่อต้น ☐ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเอนซิส (60 กรัม) ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครชีส (30 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	หนอนเจาะสมอฝ้าย	☐ พบตัวหนอนมากกว่า 1 ตัวต่อ 2 ต้น หรือ ไข่มากกว่า 1 ฟองต่อต้น ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครชีส (30 มล.) ☐ คลอร์ฟลูอาซารอน 5 % อีซี (20มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	หนอนกระทู้ผัก	☐ พบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่มากกว่า 1 ตัวหรือกลุ่มต่อ 2 ต้น ☐ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีอีโครชีส (30 มล.) ☐ คลอร์ฟลูอาซารอน 5% อีซี (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	เพลี้ยไฟ	☐ พบเพลี้ยไฟมากกว่า 1 ตัวต่อใบ/ฝัก ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	เพลี้ยจักจั่นฝ้าย	☐ พบเพลี้ยจักจั่นที่ใบมากกว่า 1 ตัวต่อใบ ☐ เฟนโทรพาทริน 10% อีซี (20 มล.) ☐ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี (50 มล.) ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ สารสกัดสะเดา (ตามคำแนะนำบนฉลาก) ☐ อื่นๆ ^{2/}		

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระจับปี่เขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบบันทึก การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูกระจับปี่เขียว	หมายเลขเอกสาร 03-03 -.....-..... เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 2/2 วันที่ประกาศใช้...../...../.....
---	--

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูกระจับปี่เขียว และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระจับปี่เขียว ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อหน้า 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัม ต่อ ไร่/ไร่ปลูก)	
	แมลงหวี่ขาว	☐ พบแมลงหวี่ขาว ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคสแคป	☐ พบอาการโรค ☐ สารแมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคใบจุด	☐ พบอาการโรค ☐ แอนทราโคล 70% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ แมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรคราแป้ง	☐ พบอาการโรค ☐ กำมะถันผงละลายน้ำ 50 ดับบลิวพี (30 กรัม) ☐ อื่นๆ ^{2/}		
	โรค/แมลงอื่น ๆ	☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้)..... ☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้)..... ☐ พบ (ระบุชื่อ)..... ☐ (ระบุชื่อและอัตราการใช้).....		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ
 2. อื่นๆ ให้ ระบุชื่อสารที่ใช้ และอัตราการใช้

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dashed lines, providing a guide for letter height and placement. The lines are evenly spaced across the entire page, which is otherwise blank.

[illegible]

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

หมายเหตุ ¹⁴ ผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก หมายถึง ผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่มีอายุฝัก 4-5 วันหลังดอกบานหรือกระเจี๊ยบเขียวที่มีความยาวฝัก 7-12 เซนติเมตร สำหรับการบริโภคสด และความยาว 5-9 เซนติเมตร สำหรับการแช่แข็ง ฝักตรง มีหัวเหลี่ยม ปราศจากตำหนิจากการเข้าทำลายของศัตรูพืชและสาเหตุอื่นปลอดจากศัตรูพืช และปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

หมายเหตุ ¹⁴ ผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก หมายถึง ผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่มีอายุฝัก 4-5 วันหลังดอกบานหรือกระเจี๊ยบเขียวที่มีความยาวฝัก 7-12 เซนติเมตร สำหรับการบริโภคสด และความยาว 5-9 เซนติเมตร สำหรับการแช่แข็ง ฝักตรง มีหัวเหลี่ยม ปราศจากตำหนิจากการเข้าทำลายของศัตรูพืชและสาเหตุอื่นปลอดจากศัตรูพืช และปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ผลิตผลที่เก็บเกี่ยว ทั้งหมด (กก.)	ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์ การคัดแยก ^{1/} (กก.)	ผู้ปฏิบัติ
รวม				

หมายเหตุ ^{1/} ผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก หมายถึง ผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่มีอายุผัก 4-5 วันหลังดอกบาน หรือกระเจี๊ยบเขียวที่มีความยาวผัก 7-12 เซนติเมตร สำหรับการบริโภคสด และความยาว 5-9 เซนติเมตร สำหรับการแช่แข็ง ผักตรง มีหัวเหลี่ยม ปราศจากตำหนิจากการเข้าทำลายของศัตรูพืชและสาเหตุอื่น ปลอดภัยจากศัตรูพืช และปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค

บันทึก

[illegible]

บันทึก

[illegible]